


Monitoraggio delle popolazioni dei turdidi tra il Mar Baltico e il Mar Nero



31^a Assemblea generale dell'AECT
Sacile, 5 settembre 2026

In Ucraina (16 transetti - 266 punti di ascolto nel 2025)

Andamento dell'abbondanza e della densità nel periodo di studio 2019-2025

Merlo = Relativa stabilità dell'abbondanza, ma diminuzione nella maggior parte dei siti vicini alle zone in cui si svolgevano operazioni militari.

Tordo bottaccio = idem

Cesena = Stabilità della popolazione pur in presenza di fluttuazioni interannuali minori. Aumento dell'abbondanza su 5 degli 8 percorsi di monitoraggio nel 2025.

Tordela = Aumento progressivo dell'abbondanza sulla quasi totalità degli itinerari di censimento, con una battuta d'arresto nel 2025.

Tordo sassello = Rari nidificanti isolati nella regione di Rivne (Ucraina settentrionale) nel 2024-2025, a conferma delle stime precedenti (Gorban, 2003).

Impatto negativo dell'anomalia meteorologica della primavera 2025 sulla densità dei nidificanti.

In Bielorussia (5 transetti - 161 punti di ascolto nel 2025)

Andamento dell'abbondanza e della densità nel periodo di studio 2019-2025

Merlo = Densità di riproduzione stabile pur in presenza di fluttuazioni annue legate alla variabilità delle condizioni meteorologiche locali.

Tordo bottaccio = idem, ma con un aumento notevole del numero di uccelli nel 2025 su tutti i siti di censimento (in alcuni habitat, la densità della specie ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sette anni).

Cesena = idem


Tordela = Apparente aumento della densità di riproduzione (differito rispetto ai paesi vicini).

Tordo sassello = Leggero aumento della densità di riproduzione nel 2025 nel nord-ovest del paese (a nord del fiume Dvina), dove la specie è abbastanza comune seppur poco numerosa, mentre è molto rara nel resto del paese.


In Russia (regione di Leningrado)

(6 transetti - 125 punti di ascolto nel 2025)

Merlo




Tordo bottaccio



Calo della popolazione di merlo - Stabilità della popolazione di tordo bottaccio


In Russia (Regione di Leningrado)

Tordela



Stabilità (ultimi 5 anni)

Tordo sassello




Rarietà (su 3 dei 125 punti di ascolto)

Presenza poco numerosa

In Russia (regione di Leningrado)

Rapporto giovani/adulti dei turdidi catturati al Lago Ladoga (LOS) durante la migrazione post-riproduttiva 2025



Calo della percentuale di giovani uccelli delle tre specie rappresentate

Conclusioni

- ▶ Le due specie più comuni nella regione tra i due mari, il merlo e il tordo bottaccio, rappresentano oltre l'80% della popolazione totale di turdidi, con proporzioni simili in tutti i paesi.
- ▶ Si rileva un aumento a lungo termine molto marcato della popolazione di merlo: negli anni '70 e '80, questa costituiva solo il 15-20% della popolazione regionale di turdidi, contro il 70% del tordo bottaccio. Questo forte incremento è in parte dovuto all'efficace utilizzo degli habitat urbani e periurbani a partire dagli anni '80.
- ▶ La popolazione riproduttiva di tordo bottaccio della regione è stabile, con fluttuazioni annue dettate principalmente dalle condizioni climatiche stagionali.
- ▶ La popolazione riproduttiva regionale di cesena è tendenzialmente stabile, sebbene sia difficile valutarne l'andamento demografico attraverso il metodo dei punti di ascolto. Si registrano densità molto elevate di coppie nidificanti nei siti in cui la specie forma delle colonie; altrove le densità sono generalmente basse.

Conclusioni

- ▶ Il rapido incremento della popolazione di tordela indica l'espansione globale verso est dell'areale di distribuzione di questa specie, che nel XX secolo era un nidificante raro in Ucraina, in Lituania e nella regione russa di Kaliningrad.
- ▶ Il declino regionale della popolazione nidificante di tordo sassello rivela l'erosione del margine occidentale del suo areale di distribuzione. L'estensione e la viabilità delle foreste umide (anche note come ontaneti), che costituiscono il suo habitat di riproduzione principale, stanno diminuendo rapidamente sotto l'impatto combinato del riscaldamento globale e dei grandi lavori di bonifica idraulica avviati in tutti i paesi dell'Europa orientale. L'evoluzione della vegetazione naturale ai confini nord-orientali dell'areale (in Siberia) potrebbe invece risultare favorevole alla specie.
- ▶ In Bielorussia si è registrato un incremento complessivo del 9,4% delle popolazioni di turdidi dal 2019 al 2023, e in Ucraina del 5,86%; l'aumento più significativo (pari al 56,1% tra il 2015 e il 2021) è stato rilevato nella regione russa di Kaliningrad. La sola Lituania ha registrato un forte calo (33,02%) delle proprie popolazioni di turdidi tra il 2018 e il 2023, con tutte le specie in diminuzione.

Continuazione del programma

- ▶ Il programma prosegue nonostante le difficoltà derivanti dall'Operazione speciale condotta in Ucraina dal 2022.
- ▶ Riduzione del campo di monitoraggio delle popolazioni di uccelli, legata all'impossibilità di accedere ad alcuni siti e alle difficoltà di contatto con alcune équipes.
- ▶ L'analisi dei dati è in corso in vista della pubblicazione di un articolo di sintesi.
- ▶ Il monitoraggio mostra che le popolazioni di turdidi non sono minacciate a medio-lungo termine, con alcune specie – come il merlo e la tordela – che si rivelano in espansione. Si pone la questione se proseguire questo monitoraggio. Non bisognerebbe orientare lo sforzo di ricerca verso nuovi obiettivi?
- ▶ Stabilire le ragioni del declino regionale della popolazione occidentale di tordo sassello: verificare l'impatto del cambiamento climatico, osservare se la specie stia colonizzando nuovi territori più a nord-est.
- ▶ Identificare le ragioni dell'incremento demografico della tordela e studiare il comportamento migratorio della sua popolazione, in particolare grazie all'uso di sistemi GPS.

Ringraziamenti



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



Fédération Nationale
des Chasseurs

