Il Controllo della predazione

Dott. Francesco Santilli





Predatori generalisti

Sono quelle specie particolarmente adattabile e che per motivi principalmente di carattere antropico si trovano in una situazione di sovrabbondanza









Anche il cinghiale può essere un predatore, soprattutto di nidi





Il controllo della predazione è un concetto diverso dalla “lotta ai nocivi”. E’ l’applicazione delle conoscenze di eco-etologiche al fine di mantenere il miglior equilibrio possibile e tutelare le specie in declino











Il controllo della predazione è richiesto anche nei piani di gestione nazionali e internazionali di specie come la pavoncella e il chiurlo maggiore











“In ogni caso, prevenire l'estinzione locale di specie sempre più rare come il chiurlo, la pavoncella o la starna non dipende dalla riduzione della popolazione nazionale di volpi: un'idea del genere è chiaramente insostenibile. Quando un proprietario di casa o un comune decide di affrontare un'infestazione di ratti, il suo successo non si basa sulla riduzione della popolazione di ratti a livello di nazione, ma sull'eliminazione degli animali problematici in un determinato luogo.

Ciò che solitamente serve è un'azione mirata, efficiente e umana, intrapresa al momento giusto e nel posto giusto”.

Ian Coghill

Presidente, Game and Wildlife Conservation Trust











Per controllare efficacemente una popolazione di una specie occorre conoscere bene la sua biologia:
il caso dei corvidi



Corvidi riproduttori





Corvidi vaganti





Bravo, C., Pays, O., Sarasa, M., & Bretagnolle, V. (2020). Revisiting an old question: Which predators eat eggs of ground-nesting birds in farmland landscapes?. *Science of the Total Environment*, *744*, 140895.

Dott. Francesco Santilli

Per controllare efficacemente una popolazione di una specie occorre conoscere bene la sua biologia:
il caso dei corvidi



Corvidi riproduttori





Corvidi vaganti





Bravo, C., Pays, O., Sarasa, M., & Bretagnolle, V. (2020). Revisiting an old question: Which predators eat eggs of ground-nesting birds in farmland landscapes?. *Science of the Total Environment*, *744*, 140895.

Dott. Francesco Santilli





Corvidi riproduttori





Corvidi vaganti





Bravo, C., Pays, O., Sarasa, M., & Bretagnolle, V. (2020). Revisiting an old question: Which predators eat eggs of ground-nesting birds in farmland landscapes?. *Science of the Total Environment*, *744*, 140895.

Dott. Francesco Santilli

Volpe

Periodo principale di intervento:

Gennaio - Marzo





- Il territorialismo riduce la probabilità che la volpe prelevata sia sostituita da un’altra senza territorio
- La dispersione è minima
- Le femmine non hanno ancora partorito
- Non è ancora iniziata la riproduzione di lepre (solo molto parzialmente), e dei galliformi

